




**INFORME ESPECIAL.
Cultivos estivales 2010/2011
Noviembre 2010**

Permitida su reproducción total o parcial citando la fuente.

La campaña transcurre con ritmos de siembra definidos por la disponibilidad de lluvias, cuyo retorno en esta primavera se ha dado en general adelantado a otros años, pero igualmente despasejo en cantidad y momento de ocurrencia.

Algunas lluvias ya en el mes de octubre, y otras en los últimos días, permitirán completar la implantación de la campaña 2010/2011.

En general, en el mes de noviembre se han producido lluvias en buena parte del territorio provincial según los datos relevados por nuestro Sistema de Precipitaciones. Registros en torno a los 30-40 mm de acumulados en el mes de noviembre se observan en parte de los Dptos. Río Primero, Tercero Arriba y San Justo. Pero en otros casos, los acumulados mensuales de noviembre superan los 100 milímetros, tal es el caso de las localidades de Los Molles y Alcira Gigena en el Dpto. Río Cuarto.

En tanto el sudeste provincial registra acumulados moderados, en torno a los 50-80 mm. de precipitaciones según zonas.

EL CULTIVO DE SOJA

Recordando la anterior campaña, se sembraron en Córdoba **5.361.246 hectáreas**. La producción obtenida llegó a las **14.238.586 toneladas** y el rendimiento promedio fue **de 26,7 qq/ha**.

Estimaciones realizadas a través de encuestas a colaboradores calificados, permiten elaborar una primera aproximación de área a sembrar 2010/2011 en Córdoba que se situaría alrededor de las 5.334.200 hectáreas, es decir un 0,5% menos que en la campaña anterior.

Se indican generalidades en amplias zonas, como el castigo de vientos sobre las plántulas en reciente emergencia. Otras veces el mismo fenómeno complica el estado general del cultivo por la excesiva deshidratación del perfil superficial, pero la situación es superada sin inconveniente con las posteriores lluvias.

A la fecha el cultivo de Soja evoluciona con diferentes ritmos en la provincia de Córdoba, tal como se muestra en el cuadro a continuación.

CULTIVO DE SOJA CÓRDOBA. Noviembre de 2010.

Departamento	% Av. Siembra	Estadio fenológico	Estado General / Observaciones
Colon	24	V0- V3	MB. Sin problemas en la implantación.
General Roca	63	VE - V2	MB a EXC. Buena emergencia aun en temperaturas de suelo bajas.
Gral. San Martín	46	VE – V2	B a MB. Presencia de orugas cortadoras. Suelo frío demoran emergencia.
Juárez Celman	50	VE- V4	R a B. Vientos obligan resiembras. Plagas: chinche, bicho bolita.
Marcos Juárez	40	VE -V2	B. Presencia de cortadoras sin mayor problema. Temperatura 33°C castigan plántulas.
PTE. Roque Sáenz Peña	54	VE-V1	Leve ataque de bicho bolita y cortadoras.
Río Cuarto	54	VE- V4	B. Algunos bajos helados. Algunos problemas con orugas cortadoras.
Río Primero	10	VE - V2	MB. Buenas emergencias. Por ahora sin inconvenientes.
Río Seco	sin dato	sin dato	Sin dato
Río Segundo	13	V0 - V2	MB- B. Siembras adelantadas según otros años. Buena emergencia. Maltrato por vientos.
San Alberto	0	0	sin datos
San Javier	0	0	Se sembraría menos que la campaña pasada.
San Justo	13	VE- V4	MB-B. Buena emergencia del cultivo. Algunos ataques de cortadoras
Santa María	20	V0 - V3	B. En algunas zonas los fuertes vientos lastimaron plántulas.
Tercero Arriba	35	VE - V3	B. Algunas resiembras por viento. Aislados ataques de cortadoras.
Totoral	10	V1- V3	MB. Vientos dañaron algunas plantas.
Tulumba	0	0	Esperan precipitaciones para siembras de diciembre.
Unión	55	VE- V2	B. Algunos problemas con cortadoras.

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba según encuesta a colaboradores calificados.


B: Bueno MB: Muy Bueno R: Regular Exc.: Excelente

VE: germinación del cultivo V2: Dos hojas verdaderas. V3; V4; Vn: tres, cuatro y sucesivas hojas verdaderas.

La siembra continúa completando el mapa en estos días. Parte de la calidad de la semilla utilizada se observa en el estudio realizado por el laboratorio de Semillas de la Cámara de Cereales de Córdoba, el cual señala que a la fecha de este informe se lleva controlado un 36% de las 52.000 toneladas de

semillas controladas en este laboratorio hasta el mes de junio de 2010. En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la calidad medida en términos de poder germinativo sin curar (S/C) y curado (C/C) entre la cosecha y la posterior clasificación (embolsado) según los diferentes grupos de madurez que se utilizan dentro de la provincia de Córdoba.

Recuérdese el estándar mínimo de comercialización de semillas fiscalizada que establece como mínimo un 80% de Poder Germinativo en semilla sin curar.



Fuente: Elaboración a partir de datos del Laboratorio de Semillas de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba.

Los procesos de clasificación de semillas actúan como herramienta de mejora, ya que eliminan lotes de baja calidad y/o se mejoran ciertos aspectos de la misma.

Nótese en las barras de color continuo (análisis de Poder Germinativo durante la etapa de embolsado) cómo se modificó la calidad en los diferentes grupos de madurez. No obstante las variaciones registradas, la totalidad de los análisis demuestran Poder Germinativo superior al estándar mínimo vigente de 80% de Poder germinativo.

Por lo evidenciado hasta el momento no es de suponer que se produzcan problemas de germinación en la campaña en curso.

EL CULTIVO DE MAÍZ

Las tareas de siembra continúan a la fecha. La provincia de Córdoba registra usualmente un particular ritmo de avance de la misma en función de la disponibilidad de agua y posibilidad de escapar a condiciones ambientales desfavorables en la época crítica de floración del cultivo. La zona sudeste de la provincia se caracteriza por siembras temprana, mayormente de maíz de primera, pero el oeste y norte provincial registran variabilidades zonales que determinan diferentes esquemas de siembras entre lotes segunda que se siembran sobre cultivo anterior de trigo o bien de primera tempranos y tardíos por falta de oportunidad de lluvias para la siembra.

La anterior campaña maicera en Córdoba significó la siembra de 1.353.084 hectáreas, de las cuales un 17% se destinaron a uso forrajero. De la restante superficie sembrada, se obtuvo un rendimiento promedio de 73.6 qq/ha., arrojando una producción de 8.225.190 toneladas en el ciclo 2009/2010.

Estimaciones realizadas a través de encuestas a colaboradores calificados, permiten elaborar una primera aproximación de área a sembrar 2010/2011 en la provincia de Córdoba que se situaría alrededor de 1.492.000 hectáreas para todo destino, es decir un 10% más que en la campaña anterior.

La evolución de los cultivos se refleja en el siguiente cuadro resumen.

CULTIVO DE MAÍZ CÓRDOBA. Noviembre de 2010.

Departamento	% Av. Siembra	Estadio fenológico	Estado General / Observaciones
Colon	41	VE- V5	MB. Siembra entre 5 y 80% según lluvias. Hacia el norte del Dpto. disminuye área de maíz.
General Roca	75	V4- V5	B a EXC. Viento quemó extremos de hojas.
Gral. San Martín	85	V1 - V5	B a MB. Problemas c/ vientos. Presencia de chinches y cortadoras. Estado Gral. Buenos.
Juárez Celman	81	V2- V6	R a B. Castigados por el viento.
Marcos Juárez	99	V2 - 5	B. Presencia de cortadoras, ataques importantes. Viento y calor desmejoran estado del cultivo.
PTE. Roque Sáenz Peña	90	V2- V4	Presencia de orugas cortadoras con control
Río Cuarto	79	VE - V8	B a MB. Algunas hojas dañadas por viento. Algunos problemas con orugas cortadoras.
Río Primero	35	V1- V4	MB. Siembras adelantadas. Buena emergencia. Viento + frío daño en recuperación.
Río Seco	sin dato	sin dato	
Río Segundo	65	V0- V4	MB. Buena emergencia. Sanidad OK. Viento deshilachó hojas. Heladas en recuperación.
San Alberto	55	V8- V10	MB. Cultivos bajo riego.
San Javier	60	V8 - V10	MB. Cultivos bajo riego.
San Justo	48	V1 - V5	MB-B. Siembra todo destino: grano + forraje. Algunos sufrieron heladas pero se recuperaron.
Santa María	74	V0- V4	B a MB. Zonas castigadas por viento y tierra. Urgente necesidad de agua.
Tercero Arriba	71	V2- V5	B a MB. Viento deshilachó hojas. Algunos casos resiembra obligada por descalce de plantas.
Totoral	20	VE- V3	MB. Viento deshilachó hojas. Sufriendo por falta de agua.
Tulumba	0	0	Esperan precipitaciones para siembras de diciembre.
Unión	98	V2- V6	B a MB. Viento deshilachó puntas de hojas. Pocos problemas con cortadoras.

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba según encuesta a colaboradores calificados.

B: Bueno MB: Muy Bueno R: Regular Exc.: Excelente

VE: germinación del cultivo V2: Dos hojas verdaderas V3; V4; Vn: tres, cuatro y sucesivas hojas desplegadas.

EL CULTIVO DE MANÍ

Con buen avance de siembra, el cultivo reporta estado en general bueno.

CULTIVO DE MANÍ CÓRDOBA. Noviembre de 2010.

Departamento	% Av. Siembra	Estadio fenológico	Estado General / Observaciones
General Roca	65	VE - V1	Buenas emergencias de cultivo aunque algo demoradas.
Gral. San Martín	70	V0- V3	Lenta emergencia por suelo frío, germinación en 20 días.
Juárez Celman	83	VE - V1	B a MB. Emergencia del cultivo algo despereja y demorada.
PTE. Roque Sáenz Peña	73	VE	Emergencia del cultivo algo demorada
Río Cuarto	88	VE	B. En etapa de emergencia.
Río Segundo	80	V0 - V1	B. Sin mayores inconvenientes hasta el momento.
San Javier	s/d		
Santa María	0	0	La zona es de participación mínima de maní.
Tercero Arriba	61	VE- V2	Buenas emergencias de cultivo.

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba según encuesta a colaboradores calificados.

EL CULTIVO DE SORGO

La siembra progresa a medida que se completan tareas y/o liberan maquinarias destinadas para otros cultivos.

La campaña en curso se perfila zonalmente errática en cuanto a distribución de área a sembrar. Algunas reportan que el área superaría a la del año anterior, pero otras indican una reducción con ganancias hacia maíz.

El problema con palomas se menciona como grave y con frecuencia en varios departamentos provinciales. Este es uno de los motivos que disminuye el interés en la gramínea.

Si bien las lluvias han permitido adelantar la siembra este año, las frescas temperaturas de suelo han producido en general retrasos en la emergencia del cultivo.

CULTIVO DE SORGO CÓRDOBA. Noviembre de 2010.

Departamento	% Av. Siembra	Estadio fenológico	Estado General / Observaciones
Colon	10	VE - V3	B. Disminuye área por problema con pájaros.
General Roca	10	VE.	Disminuye superficie que pasará a maíz.
Gral. San Martín	15	VE.	B. Algunas zonas reducen área por cambio a maíz.
Juárez Celman	80	V2 - V3	B. Sembrado en zonas marginales. Aumentaría área respecto ciclo anterior.
Marcos Juárez	15	VE - V2	B. Según zonas, se sembraría menos esta campaña.
PTE. Roque Sáenz Peña	65	VE- V2	B. Sin mayores problemas hasta el momento.
Río Cuarto	20	VE - V1	B. Siembra detenida por falta de agua.
Río Primero	15	VE-V2	B. Germinación algo demorada por suelo frío. Problema con palomas ↓ interés por el cultivo.
Río Seco	sin dato	sin dato	sin dato.
Río Segundo	40	VE - V3	B a MB. Caería la intención de siembra según año anterior.
San Alberto	0	0	No se hace sorgo por problema de palomas
San Javier	0	0	No se hace sorgo por problema de palomas
San Justo	10	V0 - V3	B. Uso compartido en tambo y producción de grano.
Santa María	20	V0 - V1	B. Emergencia en riesgo por frío. Siembra detenida por suelo frío.
Tercero Arriba	51	VE-V2	B a R. Algunas resiembras por viento.
Totoral	0	0	Según zonas aumentaría superficie respecto año anterior.
Tulumba	0	0	Se sembraría igual superficie que año anterior.
Unión	30	VE - V1	Sembrado en zonas marginales de recuperación de lagunas.

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba según encuesta a colaboradores calificados.

Próximos relevamientos determinarán la proporción de uso granario y uso forrajero según zona y condiciones de producción.

Ing. Agr. Silvina E. Fiant
Bolsa de Cereales de Córdoba