




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL DE SALIDA DE CAMPO

27, 28 y 29 de Noviembre del 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



**Relevamiento de campo en los Departamentos Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y sur de Juárez Celman.
Provincia de Córdoba - 27, 28 y 29 de Noviembre de 2013.**

En el presente informe se describe la situación de los cultivos invernales de Trigo y Centeno observados en los Dptos. Río Cuarto, General Roca, Pte. Roque Sáenz Peña y Sur de Juárez Celman.

Conjuntamente, se presenta el estado observado a campo en Maíz y Girasol.



El cultivo de trigo en los departamentos relevados representa aproximadamente el 22 % respecto al total de la producción provincial, siendo General Roca el departamento que mayor producción aporta.

Cuadro N°1: participación de los cultivos de trigo en la zona relevada.

Departamentos	Producción estimada (Tns.) 2013/2014	Participación en relación al total provincial (%)
General Roca	43.213	6,03
Juárez Celman	38.099	5,31
Pte. Roque Sáenz Peña	33.875	4,72
Río Cuarto	40.591	5,66
Total	155.778	21,72
Prov. Córdoba	716.586	100


Fuente: Elaboración propia en base a datos generados por el D.I.A. BCCBA



Evolución de las precipitaciones

Como consecuencia de las reducidas precipitaciones durante el período crítico del cultivo, los rendimientos de se vieron afectados negativamente.

En este sentido y según información brindada por la red de colaboradores del D.I.A, los rendimientos promedio estimados, para el cultivo de trigo bajo superficie de secano en los Departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca alcanzarían los 18 qq/ha y 16 qq/ha respectivamente, mientras que para los Departamentos Juárez Celman y Río Cuarto se esperan rendimientos inferiores a los 13 qq/ha.



Fuente : Sistema de Precipitaciones – BCCBA

Situación de los cultivos invernales.

Durante el recorrido se pudo observar que los principales cultivos invernales relevados, de Trigo y Centeno, presentan en general un estado avanzado en su fenología, observándose desde grano lechoso a madurez.

Casi la totalidad de la superficie destinada para el cultivo de trigo se encuentra bajo agricultura de secano, siendo el estado general de los cultivos de la zona de bueno a regular, con un rendimiento promedio que ronda los 15 qq/ha.

Aunque en baja escala, sólo se observó la presencia de agricultura bajo riego en los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman, donde los rendimientos estimados alcanzarían los 30 qq/ha y 40 qq/ha respectivamente; consecuentemente el estado general de los mismos evidencia mejores resultados.



Trigo en secano. Estado fenológico de grano pastoso, con cobertura de plantas uniforme. El estado general del mismo es bueno, no observándose plagas o enfermedades.



Foto tomada el 27/11/2013 a 7 km al SE de la localidad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto.

Fuente: BCCBA

Centeno en madurez fisiológica, el estado general del mismo es de regular-malo.



Foto tomada el 29/11/2013 a 2 km al SO de la localidad de Vicuña Mackenna, Dpto. Río Cuarto.

Fuente: BCCBA

Centeno próximo a cosecha, en estado general bueno, con presencia de malezas.



Foto tomada el 27/11/2013 a 3 km al Norte de la localidad de Villa Valeria, Dpto. General Roca.

Fuente: BCCBA



Trigo en estado general bueno, en fenología de grano lechoso.



Foto tomada el 27/11/2013 a 11 km al Oeste de la localidad de La Nacional, Dpto. General Roca. Fuente: BCCBA

Trigo en estado general regular, en fenología de grano lechoso. Cobertura del lote irregular.



Foto tomada el 29/11/2013 a 2 km al Norte de la localidad de Guardia Vieja, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA

Trigo en estado general muy bueno, en fenología grano pastoso, en buenas condiciones de cobertura de lote.



Foto tomada el 29/11/2013 a 1km al NE de la localidad de Colonia la Guanita, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA



Cultivos de verano

Girasol en estado general bueno, en fenología V3, observándose heterogeneidad espacial en la distribución de plantas.

Respecto al estado sanitario del cultivo, se observaron plagas del tipo cortadoras y medidoras.



Foto tomada el 27/11/2013 a 32 km al NE de la localidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca. Fuente: BCCBA

Maíz con daños por granizo, se encuentra en estado V6-V7 de la escala fenológica del cultivo.

Según colaboradores del D.I.A, del total de la superficie que se estima sembrar en el Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña para la campaña 2013/2014, el 40% de la misma corresponde a siembras tempranas del cultivo.



Foto tomada el 29/11/2013 a 20 km al SE de la localidad de Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. Fuente: BCCBA

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

