





BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL N° 60

3° INTENCIÓN DE SIEMBRA ESTIVALES 2013/2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification




INTENCIONES DE SIEMBRA ESTIVALES CAMPAÑA 2013/2014 Y PRECIPITACIONES

Las precipitaciones del mes de noviembre permitieron avanzar con la siembra de soja marcando una pausa en maíz y sorgo que retomarían su siembra durante el mes de diciembre en Córdoba.

Precipitaciones mensuales acumuladas en Córdoba
Noviembre de 2013



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba



Fuente: SMN



Las intenciones de siembra en Córdoba 2013/2014 continúan sosteniendo el incremento de superficie de soja en detrimento de maíz, tal lo anticipado en octubre. La principal causa se atribuye a la falta de reserva hídrica en suelo durante octubre, lo cual hizo perder la época óptima de siembra de maíz temprano, inclinándose en consecuencia a soja.

CULTIVOS	Superficie sembrada campaña 2012-13	3° intención diciembre 2013	Variación interanual (%)
SOJA	4.628.426	4.906.748	6
MAÍZ	1.629.726	1.468.882	-9,9
SORGO	297.261	291.314	-2

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Según datos provisorios, se sembró antes del primero de noviembre sólo el 23% del área que se implantaría con el cereal a nivel provincial, siendo los departamentos del sudeste, Unión y Marcos Juárez, los de mayor porcentaje de avance de siembra (72 y 74% respectivamente).

La zona norte de la provincia (departamentos Río Primero, Totoral, Tulumba y Río Seco) se caracteriza por fechas de siembra tardías, lo cual no sufrirían modificaciones en este tercer relevamiento debido a que las mismas se concentran en diciembre.

Los maíces sembrados tempranos se encuentran en estado general Muy Bueno (63%) y Bueno (37%). Sanitariamente en la etapa temprana del cultivo hubo presencia de cortadora y chinche de incidencia baja para el cultivo de maíz.

Se reportaron daños ocasionados por las fuertes tormentas registradas a principio de diciembre que indican que se están resembrando unas 300-400 has de soja en la zona de Las Junturas (Dpto. Río Segundo), en cuanto al maíz, por las condiciones climatológicas, aún no se ha sembrado. En Alcira Gigena (Dpto. Río Cuarto) se resembraron unas 15.000 has de soja, mientras que para maíz, el cálculo resulta en 20% del maíz temprano.

**Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba**

