




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME ESPECIAL AGROCLIMA N°61

30 de diciembre del 2013



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Precipitaciones

El comportamiento de las variables meteorológicas como precipitaciones y temperaturas sucedidas en el mes de diciembre en la provincia de Córdoba influyen fundamentalmente en el avance de siembra de los cultivos estivales. A continuación se presenta la distribución espacial de las lluvias acumuladas (mm) en el mes de diciembre 2013 en la Provincia de Córdoba.


Mapa N° 1: Precipitaciones Acumuladas por Departamento.
Diciembre 2013. Prov. Córdoba.




Fuente: Sistema de Precipitaciones – BCCBA

En el 58% de los departamentos agrícolas de la provincia de Córdoba las precipitaciones acumuladas del mes diciembre fueron inferiores al promedio de los últimos 7 años, tal como se presenta en el siguiente gráfico comparativo de lluvias acumuladas en diciembre 2013 versus el promedio desde el 2007 al 2013.





En general, la totalidad de la provincia de Córdoba presentaba déficit hídrico hasta el 20 de diciembre, por lo que las precipitaciones ocurridas a posterior lograron recargar el perfil de suelo permitiendo la siembra de los cultivos. En el mapa que se presenta a continuación la reserva de agua útil en el suelo es inferior al 40%.




Fuente: elaborado en base al SMN.



Temperaturas

Las temperaturas del mes de diciembre 2013 fueron elevadas, tal la percepción generalizada de la población. El mapa siguiente muestra promedios mensuales de temperaturas máximas concentradas en la franja este provincial; y núcleos en el centro; en el oeste (en zona de Traslasierra) y el extremo suroeste con valores superiores a los 36°C.

Mapa N° 2: Temperaturas Máximas Promedios.
Diciembre 2013. Prov. Córdoba



Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

Altas temperaturas, en conjunto con deficiencias de agua, determinaron una peligrosa conjunción para el bienestar de los cultivos ya implantados, así como una demora en la siembra de los últimos del calendario. Para ambos resulta indispensable una recuperación con próximas precipitaciones, siempre y cuando las mismas se presenten dentro de intensidades apropiadas.

Vientos y temporales

Diversas zonas han sido alcanzadas en este último tiempo por temporales de magnitud variable, acompañados de fuertes vientos y lluvias de marcada intensidad, por ejemplo en *Tancacha*. Acciones relacionadas con la defensa civil para restablecer el orden fueron necesarias en *Hernando* en el último fin de semana de diciembre de 2013.

El ciclo biológico vegetal, indica ahora un tiempo de espera antes de poder predecir resultados sobre la campaña en curso.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

