




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Informe Número 60

Situación de Cultivos Estivales – Estimación de producción

Marzo de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification




Generalidades del Período

Hacia mediados de marzo se inició la cosecha de maíz y soja en los departamentos Marcos Juárez y Unión, con un avance inferior al 10% del área. Los primeros datos parciales de rendimientos obtenidos van de 80-120 qq/ha en maíz y entre 30-50qq/ha en el caso de la oleaginosa.


Climáticamente, después de atravesar un **enero** 2014 con escasas precipitaciones y registros de temperaturas superiores a 40°C hacia el extremo norte y sur de la provincia de Córdoba, **febrero y la primera quincena de marzo** se caracterizaron por copiosas lluvias.

Precipitaciones mensuales acumuladas en Córdoba

Febrero 2014



Temperatura (°C) máxima media mensual Febrero



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El acumulado de precipitaciones de marzo varía entre 125 a 300 mm, excepto Dpto. Gral. Roca (Río Quinto hacia sur), que continúa siendo el sector de Córdoba menos favorecido, con lluvias inferiores a 100 mm.

Las temperaturas y las escasas radiaciones dadas en los últimos 45 días podrían afectar al peso del grano. La temperatura máxima media mensual de febrero 2014 fue de 2 a 4°C inferior respecto al año anterior.

El seguimiento de los aportes hídricos de marzo puede consultarse en los siguientes links:

<http://www.bccba.com.ar/bcc/clima.asp>;

http://www.bccba.com.ar/bcc/index_marco.asp?IDPagina=3&Codigo=3&acumulado=Mes



CULTIVO DE MAÍZ

El segundo cálculo de producción 2013/2014 en la provincia de Córdoba, arroja **10.319.097 Tns.** de maíz, un 4,9% superior a la campaña anterior.

Cuadro comparativo de producción de maíz en la provincia de Córdoba

Maíz Córdoba	2011/2012	2012/2013	2013/2014 provisoria		Variación interanual (%)
			Febrero	Marzo	
Hectáreas sembradas	1.813.476	1.629.726	1.468.882	1.468.882	-9,9
Hectáreas consumo animal	453.407	214.874	158.702	166.449	-22,5
Hectáreas cosechables	1.360.069	1.414.852	1.310.180	1.302.433	-7,9
Rendimiento (qq/ha)	50,8	69,5	77,3	79,2	14
Producción (Tns.)	6.906.509	9.833.322	10.138.310	10.319.097	4,9

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

El rendimiento promedio provincial estimado es 79 qq/ha, resulta 14% superior al ciclo anterior, aunque aún no descartan que la menor radiación y bajas temperaturas pudieran afectar el periodo de llenado de grano, viéndose reflejado en el rendimiento a estimar en los próximos días.

Los maíces tempranos están en madurez fisiológica (MF), a la espera de pérdida de humedad y de tener un adecuado piso para ser cosechados.

Aquellos sembrados tarde, fenológicamente están atravesando el periodo de llenado de grano (R3-5), exceptuando al norte de la provincia que van desde floración a inicio de llenado (R1-R3).

En cuanto al estado sanitario, se reporta una incidencia baja de enfermedades como Roya y Tizón.

CULTIVO DE SOJA

El segundo cálculo de producción de soja en Córdoba indica un valor de **13.206.750 Tns.** un 16% superior respecto al ciclo anterior.

Cuadro comparativo de producción de soja en la provincia de Córdoba

SOJA CÓRDOBA	2011/2012	2012/2013	2013/2014 provisoria		Variación interanual (%)
			Febrero	Marzo	
Hectáreas sembradas	4.516.297	4.628.426	4.906.748	4.906.748	6
Hectáreas perdidas	150.722	98.989	s/d	132.648	34
Hectáreas cosechadas	4.365.575	4.529.436	4.906.748	4.774.100	5
Producción (Tns.)	7.841.949	11.423.480	13.457.211	13.206.750	16
Rendimiento ponderado (qq/ha.)	18	25	27	27,7	11

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Hacia fines de marzo comenzaría la cosecha de sojas tempranas, excepto al este provincial en donde las de ciclo corto ya han comenzado a ser recolectadas. Fenológicamente, las sojas tardías (57% de la superficie sojera provincial) se encuentran en pleno llenado de grano (R5).

Sanitariamente, en general se visualiza una incidencia baja de enfermedades de fin de ciclo (EFC) y chinches.



CULTIVO DE SORGO

La segunda estimación indica una producción de sorgo 2013/2014 de **1.280.142 Tns.** un 6% superior respecto al ciclo anterior.


Cuadro comparativo de producción de sorgo en la provincia de Córdoba

SORGO CORDOBA	2011/2012	2012/2013	2013/2014 provisoria	Variación Interanual (%)
Hectáreas sembradas	298.239	297.261	291.314	-2
Hectáreas consumo animal	44.263	59.719	71.879	20
Hectáreas cosechables	253.976	237.542	219.435	-8
Rendimiento (qq/ha)	50,8	51,1	58,3	14
Producción (Tns.)	1.289.272	1.212.858	1.280.142	6

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Fenológicamente están en periodo de llenado, con un estado general del **64%** entre Excelente y Muy Bueno.

Estado general de cultivos estivales: primera quincena de marzo.



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

Los cultivos han mejorado respecto al relevamiento del mes de febrero.



Situaciones particulares dadas en la provincia



Fuente: Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba

**Este provincial:* durante el mes de febrero al 18 de marzo el acumulado alcanza 350 mm, lo cual produjo lotes anegados y dificultad en el inicio de la cosecha gruesa.

**Sur provincial:* Consecuencia de las escasas lluvias de fines diciembre – enero, estiman que el 50% de los maíces sembrados temprano debieron ser destinados a consumo animal.

**Centro-oeste:* el área afectada por la pedrea del domingo 9 de marzo comprende Berrotarán (Dpto. Río Cuarto) hasta unos 20 km antes de Oliva (Dpto. Tercero Arriba), con un ancho de 15 km aproximadamente. De acuerdo a un primer relevamiento realizado por colaboradores zonales, la superficie agrícola afectada alcanzaría las 50.000 hectáreas. Estiman que en un 50% el daño es total; y aquellos lotes menos afectados, de cosecharse, probablemente estarán castigados por calidad comercial, ya que el daño en vainas y mazorcas es potencial vía de ingreso de patógenos a los granos.



Zona rural Los Cóndores (Dpto. Calamuchita)



10/03/2014 - Lote de maíz tardío etapa de llenado (R4)



10/03/2014 - Lote de soja tardía etapa de llenado (R5)

Gentileza: Cooperativa Agrícola Los Cóndores

Zona rural Berrotaran (Dpto. Río Cuarto)



10/03/2014 - **Lote maíz**, Gentileza: Miguel Ruffino



10/03/2014 - **Lote maní**, Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba

La cuantificación de hectáreas afectadas y porcentaje de superficie no cosechable es aún provisoria. Las mismas serán ajustadas en próximos informes realizados por la Bolsa de Cereales de Córdoba una vez que se hayan definido biológicamente las consecuencias de los factores negativos sufridos por las diferentes zonas.

El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el mes de marzo de 2014.

Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba

