




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME SALIDA A CAMPO N°19

10 de Abril de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo en Dpto. San Javier, San Alberto y NE de San Luis. 10 de Abril de 2014.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maíz, maní, sorgo y algodón** observados en los Dptos. San Javier y San Alberto de la Provincia de Córdoba. También en este recorrido parte del Dpto. Junín de la Provincia de San Luis



Las estimaciones 2013/2014 realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA-BCCBA), durante el mes de marzo, indican que la producción de maíz y soja en la zona visitada, representan menos del 1% del total provincial para ambos cultivos.

Cuadro N°1: Participación de cada cultivo en la zona relevada, según producción (Tns). Campaña 2013-14

Departamento	Tns. Maíz	Tns. Soja
San Alberto y San Javier	33.380	15.380
Total Prov. Córdoba	10.319.097	13.206.750
Relación respecto al total provincial (%)	0,3 %	0,1 %

Fuente: Departamento Información Agroeconómica – Bolsa Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos de estivales

El estado general de los cultivos observados durante el recorrido es *muy bueno*, y si bien casi la totalidad de ellos se riega complementariamente, esto no alcanzó para mitigar las altas temperaturas y la falta de precipitación registradas en enero. El cultivo de **soja** en su gran mayoría se encuentra en madurez, próximo a cosecha. En las de siembras mas tempranas, afectadas negativamente por las altas temperaturas del mes de enero, se esperan rendimientos de 20 a 25qq/ha promedio, mientras que para las mas tardías de 30 a 35 qq/ha.

El **maíz**, en general más atrasado en su fenología, está en grano pastoso (R4). Sanitariamente se encontraba en muy buen estado, solo afectado por oruga de la espiga (*Heliiothis zea*) y carbón común del maíz causado por *Ustilago maydis* en aisladas ocasiones. Los rendimientos esperados en la zona varían desde los 80 a los 90 qq/ha, dependiendo de la fecha de siembra.



El **maní** con un porcentaje de arrancado menor al 8%, se encontraba en muy buen estado general, esperándose rendimientos de 40 qq/ha en caja.

El cultivo de **algodón** en su peor año, según datos reportados por la Red de Colaboradores del D.I.A. Normalmente en la zona visitada, para este cultivo se cosechan 50 qq/ha en bruto y 1750 qq/ha de fibra, pero este año se esperan 40 qq/ha en bruto y persiste hasta el momento de la cosecha, la incertidumbre del rendimiento en fibra. Los lotes sembrados tempranos fueron mas afectados por las altas temperaturas de enero, en tanto que para los mas tardíos, en un alargamiento de su ciclo por la baja radiación de los meses de marzo y abril, con el riesgo potencial de la no apertura de sus capullos si se adelantan las heladas.

El estado fenológico de los mismos es de M2 en la Escala de Poisson J. A, más del 60% de cápsulas abiertas.

Sanitariamente se reportó *Alternaria* sp. que produjo lesiones en hojas y caída prematura de las mismas. En cuanto a plagas que afectaron al cultivo, se mencionó Chinche Verde (*Nezara viridula*).

Archivo fotográfico del recorrido

Algodón. Lote bajo riego. En estado fenológico M2, mas del 60% de sus cápsulas abiertas. 100% de cobertura del lote.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de algodón en la zona es de 40 qq/ha en bruto.



Foto tomada el 09/04/2014 en la zona límite entre las Provincias de Córdoba y San Luis a la altura de la localidad de Los Cerrillos, Dto. San Javier.

Fuente: BCCBA

Soja. Lote bajo riego. En R8, maduréz plena. No se observaron plagas ni enfermedades.

Según Red de Colaboradores del D.I.A., el rendimiento promedio esperado de sojas en la zona es de 30 a 35 qq/ha.



Foto tomada el 09/04/2014 en la zona de San Miguel, Dpto. San Alberto.

Fuente: BCCBA



Soja. Lote bajo riego. En R7-8, maduréz. No se observaron plagas ni enfermedades. Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de sojas tardías en la zona es de 30 a 35 qq/ha.

Foto tomada el 09/04/2014 en la zona de Los Cerrillos, Dpto. San Javier.
Fuente: BCCBA



Maíz. Lote bajo riego. En estado fenológico R4 (grano pastoso). Presencia de oruga de la espiga (Heliothis zea) en cabeceras del lote. Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona es de 90 qq/ha.

Foto tomada el 09/04/2014 en la zona de Los Cerrillos, Dpto. San Javier.
Fuente: BCCBA



Maní. Lote bajo riego. En estado general y sanitario es muy bueno. Estado fenológico de R8, maduréz. No se observaron malezas. Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado en la zona es de 40 qq/ha en caja.

Foto tomada el 09/04/2014 en la zona de Los Cerrillos, Dpto. San Javier.
Fuente: BCCBA



Soja. Lote bajo riego. En estado fenológico R7 avanzado (comienzo de madurez) presentando un estado general muy bueno, con presencia de malezas como chloris sp. y otras. Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de sojas tardías en la zona es de 30 a 35 qq/ha.

Foto tomada el 09/04/2014 en la zona de la Pedanía San Pedro, Dpto. San Alberto.

Fuente: BCCBA



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

