




BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

INFORME SALIDA A CAMPO N°20

14 al 16 de Abril de 2014



D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA


ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Relevamiento de campo en Dpto. Gral. Roca y norte de La Pampa. 14 al 16 de Abril de 2014.

El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maíz, maní y sorgo** observados en el Dpto. Gral. Roca de la Provincia de Córdoba. También en este recorrido se relevó cultivo de maní en la Provincia de La Pampa.



Las estimaciones 2013/2014 realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA-BCCBA), durante el mes de Abril, indican que la producción de maíz y soja en el Dpto. Gral. Roca representan menos del 10% del total provincial para cada cultivo. En el caso de Maní, la participación es aproximadamente del 28% respecto a Córdoba.

Cuadro N°1: Participación de cada cultivo en el Dpto. Gral. Roca, según producción (Tns). Campaña 2013-14

Departamento	Tns. Maíz	Tns. Soja	Tns. Maní
Gral. Roca	339.346	854.822	273.097
Total Prov. Córdoba	10.182.672	14.278.712	985.088
Relación respecto al total provincial (%)	3,4 %	6 %	27,7%

Fuente: Departamento Información Agroeconómica – Bolsa Cereales de Córdoba

Situación de los cultivos de estivales

El estado general de los cultivos de siembras tardías observados durante este recorrido se considera de Bueno a Muy Bueno, mientras que los de siembra temprana (que aún están en pie) presentan un estado general inferior, debido a las escasas precipitaciones de diciembre y enero. Cabe destacar que alrededor del 50% de la superficie de maíz temprano debió



destinarse a consumo animal en esta zona.

El cultivo de **soja** en su gran mayoría se encuentra entre madurez fisiológica y madurez de cosecha. En las de siembras más tempranas se esperan rendimientos entre 10 a 25 qq/ha, mientras que para las más tardías se estima valores entre 20 a 34 qq/ha.

El **maíz**, en general más atrasado en su fenología, está en grano pastoso (R4). Sanitariamente se observó incidencia baja por roya, tizón, oruga de la espiga (*Heliothis zea*) y carbón común del maíz causado por *Ustilago maydis*. Los rendimientos esperados en la zona varían desde los 60 a los 90 qq/ha, de oeste a este departamental.

En cuanto al cultivo de **maní** se ha comenzado con la labor de arrancado. Se pudo observar en periodo de llenado a madurez, con un estado general muy bueno. De la ruta 35 al oeste se observó lotes afectados por la helada del 12 de abril, hacia el este del departamento la incidencia fue mínima.

En el Dpto Gral. Roca se observaron con elevada cobertura de malezas, siendo la de mayor presencia *Amaranthus quitensis* (yuyo colorado), tal como fue informado por la red de colaboradores desde el inicio de la campaña.


Evidencias fotográficas del recorrido

Maní. En llenado de grano, cajas en buen estado. Se observa hojas superiores afectadas por temperaturas cercanas a 0°C del día 13 de abril.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento esperado de maní en la zona es 15 a 25 qq/ha en caja.

Foto tomada el 14/04/2014 en la zona de Villa Valeria, Dpto. Gral. Roca.

Fuente: BCCBA



Maní. En llenado de caja. Estado general muy bueno. No se observaron plagas ni enfermedades.

Según Red de Colaboradores del D.I.A., el rendimiento promedio esperado en la zona es de 32 qq/ha en caja.

Foto tomada el 16/04/2014 en la zona de Onagoity, Dpto. Gral. Roca.

Fuente: BCCBA



LA PAMPA.

Lote de maní en franja con maíz.

Estado general muy bueno, en etapa de llenado.

Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento promedio esperado de maní es de 24 qq/ha en caja.

Foto tomada el 15/04/2014 en la zona de Vertiz, provincia de La Pampa.

Fuente: BCCBA



Maíz. En estado fenológico R4 (grano pastoso). Presencia de carbón común (*Ustilago maydis*) en cabeceras del lote.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado de maíz en la zona es de 75-80 qq/ha.

Foto tomada el 16/04/2014 en la zona de Mattaldi, Dpto. Gral. Roca.

Fuente: BCCBA



Maíz. Estado fenológico próximo a madurez. Espigas chicas, con puntas carentes de grano, debido a las escasas lluvias que limitaron el llenado adecuado de las mismas. Presencia de malezas (gramíneas) en el lote.

Según Red de Colaboradores del D.I.A el rendimiento promedio esperado en la zona es de 35 qq/ha.

Foto tomada el 14/04/2014 en la zona Del Campillo, Dpto. Gral. Roca.

Fuente: BCCBA



Soja. En estado fenológico de madurez (R8). Se observa EFC y daño por chinche (incidencia baja).

Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento esperado de sojas tardías en la zona es de 18 a 28 qq/ha.

Foto tomada el 16/04/2014 en la zona de Ranqueles, Dpto. Gral. Roca.
Fuente: BCCBA



Soja. En estado fenológico próximo a madurez (R8). Estado general muy bueno, grano de buen tamaño y sin daño por plagas o enfermedades.

Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento esperado de sojas tardías en la zona es de 28 qq/ha.

Foto tomada el 14/04/2014 en la zona de Nicolás Bruzone, Dpto. Gral. Roca.
Fuente: BCCBA



Sorgo. En estado fenológico próximo a madurez. Estado general muy bueno.

Según Red de Colaboradores del D.I.A, el rendimiento esperado de sorgo en la zona es 50 qq/ha.

*Foto tomada el 16/04/2014 en la zona de Mattaldi,
Dpto. Gral. Roca.
Fuente: BCCBA*



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

